



Dato: 28. oktober 2009

## Hørings svar fra Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren

### 3. version af referenceprogram for behandling af patienter med apopleksi

Først og fremmest vil DSKS complimentere det store og grundige arbejde der er udført med dette referenceprogram. Da der er tale om en revision ville det have været hensigtsmæssigt om man indledningsvist (jf. pkt. 1.4, side 16-17) havde markeret hvilke væsentlige nye ændringer der er lavet, og eventuelle nye fokusområder, så man kunne få et hurtigt overblik i fht. det tidligere referenceprogram, herunder om der er nye anbefalinger, der også forudsætter organisatoriske tiltag og evt. tilførsel af ekstra ressourcer.

Et vigtigt aspekt er den tætte sammenhæng til evidensbaseret indikatorovervågning via det nationale indikatorprojekt. Derved sikres at referenceprogrammet i endnu højere grad anvendes og omsættes til klinisk praksis, da det vil indgå i den løbende kvalitetsudvikling på området. Det ville dog have været hensigtsmæssigt at fremsende en oversigt over de anvendte indikatorer sammen med høringsdokumentet, så sammenhængen mellem referenceprogram og indikatorer kunne have indgået i høringsfasen. Det ville også styrke sammenhængen mellem referenceprogram og indikatorer, hvis man ved næste revision tydeligt markerer i referenceprogrammet, om en klinisk anbefaling er fulgt op af en indikator.

Referenceprogrammet er revideret af en bredt sammensat arbejdsgruppe. Ved en fremtidig revision kunne man overveje at styrke repræsentationen fra primærsektoren, da en ikke uvæsentlig del af genoptræning og håndtering af daglige problemer (inkontinens mv.) varetages dér. Fra DSKS' kontakt til primærsektoren er det anført:

- Afsnit 5.8.5 Behandling af vandladningssymptomer: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune stiller forslag om, at man i dette afsnit også anbefaler fysioterapeutisk intervention til patienter med inkontinens. Der er stærk evidens for, at bækkenbundstræning til denne patientgruppe har effekt, jf. forskningsterapeut, Msc, Med.dr. Sigrid Tibæks ph.d.-afhandling, "Lower Urinary Tract Symptoms in Stroke Patients - A clinical study of prevalence, impact and effect of training" (2007), og herpå opfølgende forskningsstudier.
- Afsnit 5.11.1 Tidlig vurdering og mobilisering: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen foreslår, at respiratorisk behandling skrives ind som en del af den tidlige plan for det tværfaglige personale. Det er ofte plejepersonalet, der varetager en stor del af den respiratoriske behandling, når behovet herfor er vurderet af en fysioterapeut.

På vegne af Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren.

Med venlig hilsen

Leif Panduro Jensen  
Formand for Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren